

Ansellia africana

Ldl., Edwards's Bot. Reg. 30: t. 12 (1844).

Synoniem

Ansellia gigantea

Vindplaats

De eerste exemplaren van deze interessante plant werden door John Ansell gevonden op het eiland Fernando Po bij Kameroen, maar het verspreidingsgebied strekt zich uit over een groot deel van Afrika. Van Guinee in het westen tot Kenia in het oosten en Namibië en Mozambique in het zuiden en alles daar tussen in. Groeiend langs droge warme kusten en rivieren. Tot een hoogte van ca. 700m soms 2200m. In 1844 is de plant voor het eerste beschreven door Lindley.



Beschrijving

De plant varieert sterk in grootte en bloemkleur.

De pseudobulben zijn meestal 50 tot 80 cm lang, maar kunnen soms tot een meter hoog uitgroeien.

Ze dragen langwerpige, puntige bladeren van ca 35 cm lengte en zijn van sterke nerven voorzien.

De bloemstengel verschijnt in het voorjaar aan de bovenzijde van de nieuwe afgerijpte bulb en kan bij grote planten ook nog behoorlijk vertakt zijn waardoor een groot aantal bloemen tegelijk open kan zijn.

De bloemen van ca. 5 cm doorsnee zijn welriekend. De petalen/sepalen hebben een gele ondergrond bezet met grote bruine- soms paarsbruine vlekken en strepen. De lip is drielobbig. De middenlob is vrij breed, geel met omgekrulde randen; de zijlobben zijn hetzelfde gevlekt als de bloemblaadjes.

Aan de plant kunnen de bloemen soms 2 maanden goed blijven.

De wortelgroei is uitbundig. Een deel van de wortels groeit omhoog en heeft puntige uiteinden.

Cultuur

Een plant voor de warme of gematigd warme kas.

Potcultuur wordt veel toegepast en met succes, maar het kweken op een varenblok of stuk stam geeft ook goede resultaten. Als potmedium kan men bark gebruiken.

De puntige wortels aan de voet van de plant zijn de functie om afgevallen en opgewaaid blad van andere planten vast te houden. Dit verteert hier en komt ten goede aan de plant zelf. Het is dus raadzaam om bijv.



halfverteerd beukenblad aan de voet van de *Ansellia* tussen de wortels te stoppen.

De groeitijd van deze planten vind plaats in een periode die men niet verwacht n.l. vanaf de herfst tot voorjaar.

Na de bloei, die in het voorjaar of zomer valt, dient een vrij strenge rustperiode te worden aangehouden dus dan heel matig gieten.

In september/oktober weer beginnen met gieten, maar heel voorzichtig en de jonge scheuten ontwijken; deze verrotten snel als er zich nog onvoldoende wortels hebben ontwikkeld. Vloeibare bemesting in deze periode geeft zichtbaar goede resultaten Zodra de nieuwe bulben bijna volgroeid zijn moet al begonnen worden met het beperken van het gietwater zodra ze kunnen uitrijpen en de bloeistengels kunnen uitgroeien.

Ansellia is minder geschikt als kamerplant.

Bloeitijd

Voorjaar of zomer

Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2018

Tekst:

Tekening: J. Lodewijk