

## *Aspasia variegata* Ldl

Edwards's Bot. Reg. 22: t. 1907 (1836).

### Synoniem

*Odontoglossum variegatum*

### Vindplaats

Het geslacht *Aspasia*, met slechts een tiental soorten, komt voor in enkele Midden-Amerikaanse staten vanaf Guatemala naar het zuiden en de noordelijke staten van Zuid Amerika zoals: Colombia, Venezuela en de Guyana's en het noordelijke deel van Brazilië.

Deze *A. variegata* vind men in het noorden van Brazilië, Venezuela, het eiland Trinidad en de drie Guyana's, dus ook Suriname.

### Beschrijving

Pseudobulben nogal plat, smal toelopend, lichtgroen en voor een deel omgeven door de onderste bladscheden.

Op de bulben meestal 2 bladeren van ca. 15 cm lang. De wortelstok loopt bij gezonde planten naar alle zijden uit doordat die zich splitst.

Een vrij korte bloeistengel ontspruit uit de grootste bladschede aan de voet van de bulb, vaak pas in de winter of in het voorjaar.

Er komen hoogstens 4, zelden 5 bloemen aan van ca. 4 cm doorsnee, die lang goed blijven op de plant. De licht welriekende bloemen hebben lichtgroene petalen/sepalen waarop bruine, soms paarsbruine dwarsstrepen en stippen; vooral naar de basis. De lip is voornamelijk wit met paarse spikkels.



### Cultuur

Zowel de kweek in een stenen pot als op een varenblokje geeft goede resultaten. Ook hiervoor wordt een krappe pot aangeraden.

Het is een gemakkelijke plant, die zich vrij snel tot een bossig exemplaar kan ontwikkelen.

Bij potcultuur gebruikt men een mengsel van  $\frac{3}{4}$  bark en  $\frac{1}{4}$  sfagnum. Het klimaat waarin deze plant zich het beste zal thuis voelen is gematigd warm tot gematigd.

In de halfschaduw (50%) zal hij het goed doen.

Een uitgesproken rusttijd hoeft niet te worden aangehouden, hoewel men wel na de groeitijd; tijdens en enkele weken na de bloei, het gieten sterk moet beperken. Ook een plant enkele weken rust gunnen, nadat de bloei is afgelopen, is een belangrijke regel bij het kweken van orchideeën. Bij vele soorten is het een vereiste voor de plant om zich in die periode te kunnen voorbereiden op het vormen van de nieuwe scheuten voor het volgende jaar.

Het kweken van deze *Aspasia* en ook de nauw verwante soort *Aspasia lunata*, die iets grotere bloemen heeft, moet op de vensterbank of in de serre met de nodige zorg tot de mogelijkheden behoren.



### Bloeitijd

De bloemstengels verschijnen in de winter of het voorjaar.

### Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2019

Foto's

Tekening: Hans Lodewijk