

Bifrenaria harrisoniae (HK)

Rchb. f., Bonplandia (Hannover)
3:217 (1855).

Vindplaats

Het geslacht *Bifrenaria* omvat ongeveer 25 soorten, die voornamelijk in het noorden van Zuid- Amerika voorkomen in Venezuela, de Guyana's en Brazilië.

Onze *B. harrisoniae* is een epifyt uit de bergbossen van Oost-Brazilië die soms ook lithofytisch wordt gevonden in de volle zon op 200-700m hoogte.

Beschrijving

Pseudobulben enigszins "vierkant" in doorsnee, dicht opeen, 5 tot 7 cm hoog, donkerder van tint soms bruin aan de bovenzijde. Elke bulb draagt maar 1 blad. Dit is stug, wat leerachtig, glimmend, puntig uitlopend en tot ca 30 cm lang en 10 tot 12cm breed.

De bloemstengel komt aan de voet van de bulb en groeit eerst horizontaal en draagt 1 tot hoogstens 3 bloemen tegelijk. Deze zijn vaak 5 - 7 cm in doorsnee, wasachtig van structuur, welriekend en blijven lang goed op de plant.

De kleur kan bij verschillende exemplaren nogal variëren.

Over het algemeen zijn de petalen en sepalen roomwit tot

roze -wit, soms met gele nuances. De grote lip is

uitgesproken donkerpaars tot roodpaars, meestal zijn de

zijlobben paars geaderd. De lip is van binnen sterk behaard, de kleur in de keel van de lip is geel tot oranjegeel.



Cultuur

De kweek van deze plant zal niet veel moeilijkheden opleveren.


Het beste is een pot (soms voldoet een mandje ook wel) met een goed doorlatend mengsel van 1/4 sfagnum, 3/4 bark. Het oppotten geschiedt na de bloei, dus meestal in de zomer.

Zodra de groei van de nieuwe scheut goed doorzet verdraagt deze plant een behoorlijk dosis gietwater en zo nu en dan vloeibare meststoffen. Men moet echter, zeker in het begin, heel voorzichtig zijn en geen water in de jonge scheut gieten, die daardoor gemakkelijk te gronde kan gaan.

Na de groei, zo tegen de winter moet er minder gegoten worden.

Belangrijk is het daarna de plant gedurende minstens een maand koeler en op een **lichtere plaats** te zetten, vrijwel niet te gieten zodat de bulb kan rijpen maar er voor wel zorgen dat de bulb niet verschrompelen. Gedurende deze periode ontwikkelen zich de bloemstelen.

Verpotten moet zeer voorzichtig gebeuren omdat deze plant slecht (veel minder dan vele andere soorten) verstoring van de nog levende wortels kan verdragen.



Bloeitijd

De bloeitijd is meestal in het voorjaar of begin zomer.

Wetenswaardigheden

De bloemen laten zich niet gemakkelijk in een vaas schikken; te zware bloem voor zo'n korte steel. Onze plant is ook ongeschikt voor de snijbloemencultuur en heeft geen handelswaarde. Voor liefhebbers echter juist een heel interessante soort; lang houdbaar, welriekend en gemakkelijk in cultuur zijn toch wel factoren die ons aanspreken. Ook zij, die niet over een kasje beschikken kunnen in de kamer of serre met goed resultaat *B. harrisoniae* kweken. Wel moeten dan de giet- en rustperioden nauwkeurig aangehouden worden om werkelijk gezonde bloeiende planten te krijgen.

Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2018

Tekst: Kring Haarlem

Foto:

Tekening: J. Lodewijk