

Brassavola perrinii

Lindl., Edwards's Bot. Reg. 18: t. 1561 (1833).

Synoniem


Brassavola perrinii var. *pluriflora* Hauman, Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 376 (1917).

Vindplaats

Bolivia, Paraguay, Brazilië en mogelijk Argentinië op hoogtes tussen 2000 tot 2600 meter.

Beschrijving

Deze planten groeien voornamelijk als epifyt hoewel er ook exemplaren op de rotsen zijn gevonden. De zeer dunne ±15 cm lange pseudobulben dragen één dun, rolrond, lichtgebogen, dofgroen blad van ca. 25 cm lengte. De bloemstengel ontspruit uit een kleine schede in de oksel van het blad en vormt dan een tros van 3-6 bloemen op korte stelen. De geelwitte petalen en sepalen zijn ongeveer 4 cm lang. De ellipsvormige lip is geheel wit en iets korter en breder dan de petalen. De bloemen zijn, vooral 's avonds, welriekend.



Cultuur

Een plant voor een zeer lichte plaats (hoogstens 20% schaduw) in een gematigde kas. Hoewel de meeste *Brassavola*'s van gematigd tot warme temperaturen houden kan deze koeler gekweekt worden.

Opgehangen in een houten kratje of opgebonden op een stammetje of Mexifern plankje is een beproefde kweekmethode.

Liever niet op een Dicksonia varenblokje omdat die te lang nat blijven na het gieten.

Indien men potcultuur verkiest is het gebruik van een stenen pot met uitsluitend osmunda (bark) of Mexifern ook goed.

In het voorjaar beginnen zich de nieuwe loten te vormen, die in het najaar volwassen zijn en dan in de winter moeten afrijpen. Op deze bulben bloeit de plant in het voorjaar. Bij sommige planten begint de groei pas na de bloei in mei. Dit verschil kan gelegen zijn in de herkomst van de plant; laagvlakte of hoog uit de heuvels.

In de groeitijd is het raadzaam *Brassavola*'s pas weer te gieten als ze behoorlijk zijn opgedroogd. Mocht het in de zomer donker regenweer zijn of alleen bedekte lucht dan is besproeien voldoende.

Bloeitijd

De bloeitijd valt vaak in mei of juni en duurt ongeveer 10 dagen.

Wetenswaardigheden

De eerste exemplaren van Brassavola zijn omstreeks 1830 in Brazilië gevonden. Het zijn planten, die in de gematigd warme streken van de kust tot in de heuvels landinwaarts tot op hoogten van ca. 2000 meter voorkomen. Het geslacht Brassavola omvat 15 soorten en is verspreid in het gebied vanaf Mexico en Cuba in het noorden, geheel Midden- Amerika en de West-Indische eilanden en de Zuid-Amerikaanse staten: Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, de Guyana's, Brazilië en Paraguay; doch vooral in de warme- en gematigde streken.

Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2019

Tekening: Hans Lodewijk