

***Bulbophyllum hirtum* (Sm.) Lindl. ex Wall., Numer. List: n.º 1989 (1829).**

Synoniem

- * *Stelis hirta* Sm. in A. Rees, Cycl. 34: n.º 11 (1816).
- *Tribrachia hirta* (Sm.) Lindl., Coll. Bot.: t. 41 (1826).
- *Bulbophyllum suave* Griff., Not. Pl. Asiat. 3: 292 (1851).
- *Bulbophyllum kerrii* Rolfe, Bull. Misc. Inform. Kew 1906: 84 (1906).

Vindplaats

Een epifyt uit het hooggebergte van India in de staten Nepal, Sikkim en Bhutan op de hellingen van het Himalayagebergte en in Assam in de Khasia Hills op hoogten van 1000 tot 2000 meter boven zee. In gemengde bladverliezende bossen. Zowel in vochtige bemoste bossen als in droge laagland bossen en savanne achtige omgeving.

Beschrijving

Pseudobulben eivormig tot 4 cm hoog, zijdelings enigszins afgeplat, op enige afstand van elkaar op de vrij korte wortelstok (rhizoom).


De bulben hebben 2 lichtgroene lancetvormige bladeren tot 15 cm lang, die na elk seizoen afvallen.

Het blad is zacht en dun en ruikt bij kneuzing sterk naar cumarine (een welriekende geurstof).

De zeer dunne bloemstengel ontspruit aan de basis van de bulb, kan 25 cm lang worden en vormt aan het einde een hangende aar met zeer welriekende witte bloemetjes. De sepalen zijn dorsaal sterk behaard en 8 mm lang. De petalen zijn ongeveer even lang en aan de randen gewimperd. De veel kleinere lip is vlezig en aan de voet en de top sterk teruggebogen, zodanig dat de lip van opzij gezien halfcirkelvormig is. De randen zijn ook gewimperd. Het zuiltje is wit met 2 kleine puntjes.



foto: J. Lodewijk



tekening: J.J. Vermeulen

Cultuur

Een plant voor de gematigde kas op een lichte plaats waar voor voldoende luchtcirculatie gezorgd kan worden.

Men moet het frisse luchtige bergklimaat proberen na te bootsen met een ventilatortje en de relatieve vochtigheidsgraad op een hoog peil zien te houden. De kleine plantjes groeien uitstekend op een Dicksonia varen blokje.

In de groeitijd, die enkele weken na de bloei begint, dus mei/juni, kan met regelmatige tussenpozen gegoten worden, zodanig dat de plant steeds vochtig aanvoelt.

B. *hirtum* heeft met nog enige verwante soorten, een voor een *Bulbophyllum* wat wonderlijke groeiwijze. Zodra de bulben volgroeid zijn worden de bladeren geel en

vallen af. Tegelijkertijd wordt de bloemstengel gevormd.

In de rusttijd is de plant dus geheel kaal. Deze periode duurt niet lang want na enkele weken verschijnen alweer de nieuwe scheuten. Met de nodige zorg en ervaring zeker een plantje voor de huiskamer of serre.

Bloeitijd

De bloeitijd valt meestal in de maanden april /mei.

Wetenswaardigheden

Aantekening uit 1978:

Deze Aziatische soort behoort thans tot het grote geslacht Bulbophyllum maar zal hiervan waarschijnlijk, met enige andere soorten, moeten worden afgescheiden naar een ander geslacht op grond van bepaalde kenmerken van plant en bloem. De moeilijkheid schijnt hierbij te zijn de grote variabiliteit van de soorten onderling. Pogingen in het verleden zijn reeds mislukt; bijvoorbeeld bij de geslachten Cirrhopetalum en Megaclinium.

Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2020

Tekst:

Foto's: J. Lodewijk

Tekening: J.J. Vermeulen