

Calanthe vestita

Wall. ex Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 250 (1833).

Synoniem

- *Preptanthe vestita* (Wall. ex Lindl.) Rchb.f., *Fl. Serres Jard. Eur.* 8: 245 (1853).
- *Phaius vestitus* (Wall. ex Lindl.) Rchb.f., *Gard. Chron.* 1867: 264 (1867).
- *Alismorkis vestita* (Wall. ex Lindl.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 2: 650 (1891).

Vindplaats

Myanmar (Burma), Vietnam, Thailand, Malakka (Maleisië), Borneo en Sulawesi (Celebes).

Groeit op kalksteen in bergbossen tot een hoogte van 1000m.

Beschrijving

De *C. vestita* groeit terristisch en behoort tot de bladverliezende soorten van het geslacht *Calanthe*.

De pseudobulben kunnen zeer fors uitgroeien en soms 15 tot 20 cm. hoog worden. Ze zijn conisch van vorm, lichtgroen gekleurd en met een zilverig vlies omgeven.

Een bulb draagt 4 tot 5 bladeren, waarvan de grootste 60 à 80 cm lang en 10 cm breed kunnen worden.

De bloemstengel, die in het najaar onder aan de bulb ontstaat kan tot 70 cm lang zijn. De ongeveer 10 à 15 bloemen zijn voornamelijk wit met een geel of roze hart en de lip soms heel lichtroze gekleurd.

De bloei strekt zich uit over 6 tot 8 weken en er zijn vaak 8 tot 10 bloemen tegelijk open.



Calanthe vestita

Cultuur

Als men zelf aan de kweek van *C. vestita* begint is dat meestal in het vroege voorjaar.

Men krijgt een droge pseudobulbe en deze moet opgepot worden zodra, omstreeks maart, de nieuwe scheut, die aan de onderzijde van de bulb ontstaat ca 3 à 4 cm hoog is en wortels begint te maken.

In een plastic of stenen pot gebruikt men een heel doorlatend mengsel van varenwortel (of bark), beukenblad, veenmos en/of verteerd beukenblad en 1/4 deel verteerde koemest. In plaats van de koemest kan ook anorganische mest in behoorlijke hoeveelheden in de groeitijd gegeven worden in vloeibare vorm. De groeiperiode verloopt van maart tot oktober. Als de bulb volwassen is, worden de bladeren geel en vallen af, terwijl ook de bloemstengel vrij snel omhoog groeit. Als de bloemen reeds opengaan omstreeks november en er zijn nog bladeren niet afgevallen kan men deze zonder schade zelf verwijderen.

Het water geven dient tegen de bloeitijd sterk verminderd te worden en daarna totaal op te houden. De bulb en moeten in de pot of apart volkomen droog weggezet worden in een doos met turfmoel of zand.

Het is dus van belang, dat ieder jaar vers potmateriaal gebruikt wordt. Deze *Calanthe* verlangt een warme omgeving en zeer veel licht (25% schaduw). Voor de vensterbank lijkt ons de *C. vestita* niet zo erg geschikt.

Bloeitijd

Najaar vanaf oktober.

Wetenswaardigheden

Omstreeks 1848 door Thomas Lobb (1820- 1894) gevonden en tezamen met een grote partij andere orchideeën uit zuidelijk Maleisië naar de kwekerijen van Veitch & Sons gezonden; maar al eerder ontdekt en beschreven.

Bron:

Orchitheek NOV 1986 – 2020

Tekening: Hans Lodewijk