

Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl..

Synoniem: *Coelogyne ochracea* Ldl.



Vindplaats:

Voornamelijk op grote hoogten in het Himalayagebergte in het noorden van India. De plant werd reeds in 1846 door Lindley beschreven.

Omschrijving:

De pseudobulben zijn cilindrisch en kunnen wel 8 tot 10 cm hoog worden maar zijn meestal kleiner.

De 2 bladeren (zelden 3) zijn 2 ½ cm breed en tot 20 cm lang en vrij puntig.

De bloemstengels, van ca 20 cm, groeien recht omhoog tussen de uitgevouwen bladeren uit met 7-10 witte zoetgeurende bloemen, die tegelijk openen.

Op de lip zitten 2 hoefijzervormige heldergele vlekken, die oranjegeel omzoomd zijn. De lip is korter dan de sepalen/petalen.

Cultuur:

C. ochracea behoort niet tot de meest bekende soorten die van dit geslacht in cultuur zijn maar heeft toch wel enkele voordelen, vooral voor hen die geen kas bezitten. Het is een kleine plant en neemt dus weinig ruimte in; behoeft niet te worden opgehangen omdat de bloeiwijze omhoog groeit en is bovendien welriekend.

De kweekwijze lijkt veel op die van de soortgenoten *C. cristata*, *C. corymbosa* en *C. elata*. Het is ook een plant uit de koele frisse berggebieden waar de temperatuur soms tot aan het vriespunt kan dalen.

Het kweken in een pot of in een mandje voldoet goed. Het potmengsel moet zeer luchtig zijn en kan bestaan uit gelijke delen varenwortel of dicksonia, veenmos en geknipt beukenblad. Bij het oppotten niet hard aandrukken zodat het materiaal luchtig en veerkrachtig en heel doorlatend blijft. Eventueel moet de plant eerst tijdelijk met een bamboestokje vastgezet worden.

In de groeitijd, van het voorjaar tot sept./okt. kan bij doorgezette wortelgroei rijkelijk gegoten worden en ook wel met vloeibare meststoffen gewerkt worden, om stevige nieuwe scheuten te krijgen.

Wil men deze "koude" Coelogyne-soorten in bloei krijgen dan is een periode van rust absoluut geboden. Na de groei, omstreeks oktober houdt men geleidelijk op met gieten en plaatst de plant in een lichte koele plek, bijvoorbeeld een vorstvrije logeerkamer, koude kas of serre. Totdat de bloemstengels verschijnen wordt niet gegoten, hoogstens een enkele keer met de nevelspuit gewerkt om het verschrompelen van de bulben tegen te gaan.

Zodra de groei van de bloemstengels doorzet begint men weer matig te gieten. Heel vaak zijn dan de nieuwe scheuten ook reeds aan de groei. De bloei kan in de winter vallen maar ook veel later.

Zonder rustperiode kan men geen bloei verwachten !! Dit in tegenstelling tot de "warme"

Coelogyne.

februari 1975

