

## Dendrobium leonis (Ldl.) Rchb. f.

**Syn.** Aporum leonis Ldl.

### Vindplaats:


Deze Dendrobium is vrij algemeen in de warme en vochtige streken van Borneo, Sumatra en Malakka. Het gehele geslacht Dendrobium, met zijn ruim 1600 soorten, is vrijwel het grootste van de hele orchideeën-familie en komt over geheel Azië voor tot in Australië en ook Polynesië. Onze D. leonis behoort tot de ondersoort Aporum met 10 vertegenwoordigers, allen met een nogal merkwaardige bladstand.

### Omschrijving:

Een epifiet zonder pseudobulben met een stengel waarlangs de platte groene blaadjes afwisselend links en rechts gerangschikt staan en in één plat vlak liggen. De stengel wordt ongeveer 25 cm lang en de breedte is ca. 3½ cm met het blad erbij. De bloemetjes komen uit een bladoksel tevoorschijn op een heel kortsteeltje. Ze zijn 1½ cm in doorsnee, bleek wittig-groen met een paars-achtige tint aan de buitenkant. Op de sterk naar voren gebogen lip zit een paarse vlek. De bloemetjes hebben een zachte vanille-geur; ze bloeien niet lang en verschijnen meestal in het voorjaar tot de zomer.



foto: J. Lodewijk



tekening: J. J. Vermeulen

### Cultuur:

Een plant voor de warme kas op een plaats met veel licht en vooral een hoge relatieve vochtigheid.

Door de hangende groeiwijze van de plant is het kweken op een klein varenblokje van mexifern of dicksonia of kurkschors aangewezen. Bij het opbinden is het goed om een klein plukje veenmos mee te binden waardoor de wortelgroei beter gestimuleerd wordt.

Zolang er geen wortels zijn moet zeer voorzichtig geneveld worden. Zit de plant eenmaal vastgegroeid kan wat ruimer gegoten worden maar alleen dan wanneer de plant weer is opgedroogd. Bij te grote stukken veenmos aan de voet van de plant kan het voorkomen dat er plotseling wortelrot optreedt doordat het geheel te lang nat blijft. Dit gebeurt ook als men te vaak giet of bij bedekt en somber weer als de verdamping erg langzaam verloopt.

In de groeiperiode wel regelmatig gieten. Gedurende de rustperiode in de winter is feitelijk licht broesen met de nevelspuit voldoende.

Het toepassen van mest is alleen toegestaan bij voldoende wortelgroei.

Voor kamercultuur en in een serre lijkt ons dit een moeilijke plant.