

## **Gastrochilus dasypogon** Ldl.

**syn.:** Saccolabium dasypogon Ldl.

**Naamverklaring:** Afkomstig van het Grieks gaster = buik en cheilos = lip; vanwege de duidelijke buikvormige vorm van de lip. Dasypogon = grove baard; omdat de rand van de lip een grove baard draagt.

**Vindplaats:** De natuurlijke habitat van *Gastrochilus dasypogon* ligt in het Himalaya gebied en Thailand. In 1825 wordt deze orchidee door David Don beschreven.



*Gastrochilus dasypogon*

K. Eisses

**Beschrijving:** Monopodiale korte stam met zes tot acht, 10 tot 15 cm lange bladeren, die aan de punten ongelijk tweelobbig zijn. De korte dikke bloeistengel verschijnt tussen de bladeren en draagt vijf tot tien schattige en interessante, vrij grote bloemen. Ze vormen een cirkelvormig bloemscherm waarbij de lippen van de bloemen allemaal naar het middelpunt wijzen. De sterk geurende en lang goed blijvende bloemen zijn ongeveer 2,5 cm groot. De tongvormige petalen en sepalen zijn lichtgeel gekleurd met fijne bruine vlekjes. de buik of schoenvormige lip is onderaan wit tot geel met lichtviolet spikkeltjes. De platte, halfcirkelvormige voorlob is wit in het midden, geel en violet gespikkeld, lijkt op een grove baard en is voorzien van franjes.

**Kweekwijze:** *Gastrochilus dasypogon* wordt gematigd tot warm gekweekt. In de groeitijd heeft de plant veel water, hoge luchtvochtigheid en luchtcirculatie nodig. In de niet duidelijke rusttijd wordt minder gegoten. De plant mag echter niet verwaarloosd worden, omdat ze geen pseudobulben heeft. Voor de vorming van de bloemen is een lichte niet te zonnige standplaats gewenst. *Gastrochilus dasypogon* kan evengoed op kurkschors als in een mandje gekweekt worden. Als plantmateriaal is een luchtig mengsel van sfgnum met boomvaren voldoende. Vermeerderen is mogelijk, door scheuten (met wortels) van volwassen planten af te nemen.

**Bloeitijd:** september tot december

door Gaby Zajdenband  
uit: Orchika  
11-04-2001