

Gongora quinquenervis R&P.



Vindplaats;

In de Zuid Amerikaanse staten Colombia, Equador, Venezuela, het eiland Trinidad en de Guyana's, dus ook Suriname.

Omschrijving;

Pseudobulben tot 7½ cm hoog, sterk gegroefd, elk met 2 lichtgroene, duidelijk generfde bladeren van ca. 40 cm lang en 10 cm breed. De bulben worden aan de basis omgeven door 2 d 3 vliezige scheden, die al spoedig verdorren nadat ze volgroeid zijn. De roodbruine bloemstengel ontspruit in de na-zomer aan de voet van de rijpe bulb; groeit eerst schuin omhoog en buigt zich later om en komt tenslotte verticaal omlaag te hangen. Bij gezonde grote planten kunnen soms 3 á 4 bloemstengels aan 1 bulb komen, niet tegelijk, maar meestal in verloop van één of twee maanden. Sommige stengels hebben een lengte van 60 tot 75 cm en kunnen dan ruim 40 bloemen dragen. De welriekende bloemen hebben een gele grondkleur waarop vele rode- tot roodbruine stippels en strepen. De vorm wijkt in sterke mate af van de gangbare bloemvormen en heeft iets van een insect. De bloeitijd valt meestal in de maanden augustus en september en duurt per stengel een week tot 10 dagen.

Cultuur:

Een plant voor de warme kas op een lichte plaats met minstens 75% zon in de zomer. Door zijn hangende bloeiwijze moet de pot of het houten kratje, waarin de plant is opgepot, opgehangen worden. Het potmateriaal kan bestaan uit 3/4 varenwortel, waardoor heen 1/4 deel veenmos/beukenblad-mengsel is gewerkt. Dit is veerkrachtig en luchtig en behoorlijk doorlatend. De plant moet hier stevig in worden opgepot en kan heel lang met dit mengsel toe, totdat na 3 á 4 jaar de bulben over de rand zouden gaan groeien. Dan is, in het voorjaar, splitsing (scheuren met behulp van een schaar) en verversing van het potmateriaal noodzakelijk. Dit type Gongora heeft in de groeitijd (zomer) wekelijks water nodig en kan afwisselend ook goed vloeibare meststoffen verdragen. Na de bloei en ook gedurende de winter moet de plant heel licht vochtig gehouden worden maar mag niet geheel uitdrogen, totdat in het voorjaar de nieuwe scheuten weer verschijnen. Zolang de jonge uitlopers zelf nog onvoldoende wortels hebben gevormd- de scheut is dan ca. 10 cm hoog- moet zeer voorzichtig met het gieten worden begonnen. Ze zijn dan nog heel gevoelig voor water; er mag dan nog geen gietwater tussen de tere nog opgevouwen blaadjes stagneren. Dit zou al spoedig tot rotting aanleiding geven. Voor kamerweek of serre lijkt ons deze soort te veel problemen te geven.

november 1976

