

***Laelia albida* Batem. ex Lindl.**

Sectie *Kalolaeliae* (Schlechter)
Synoniemen *Bletia albida* Rchb.f.
***Cattleya albida* Beer.**
***Laelia discolor* A. Rich. & Gal.**

Vindplaats

Deze nogal bloeiwillige soort wordt gevonden in Mexico en wel voornamelijk in de provincie Oaxaca - waar vele andere soorten van de Mexicaanse *Laelia*'s worden gevonden - ze groeien daar voornamelijk op eikenbomen. De vindhoogten variëren van 1300 tot 2600 meter boven de zeespiegel. Het is daar doorgaans aan de koele kant. De eerste planten van deze soort werden gevonden in de omgeving van de plaats Santo Pedro.

Beschrijving

De dicht op elkaar staande, peervormige, harde pseudobulben worden 3 - 4 cm lang en zijn sterk gegroefd, vooral op latere leeftijd.

Aan de top van de bulbe staan meestal 2 smalle, lancetvormige, stugge en leerachtige bladeren, deze bladeren eindigen in een scherpe punt.

De bloeiwijze, die vanuit de top van de bulbe ontspringt, kan een lengte bereiken van 50 cm, maar wordt doorgaans niet langer dan 35 tot 45 cm. Aan het bovenste gedeelte ontspringen losjes uit elkaar 3 tot 6 fraai gevormde bloemen; deze bloemen geuren fijn en bereiken een diameter van plm. 5 cm.

Deze soort werd voor het eerst beschreven door Bateman in: The Botanical Register - vol. 21 -fol. 1751 (1839).

Cultuur

Zoals alle Mexicaanse soorten uit het geslacht *Laelia* en wel speciaal uit de sectie *Podolaeliae*, komt ook deze van tamelijk grote hoogte uit een nogal droog gebied, daarom is het het beste om ze een koel-gematigd plaatsje te geven waar ze het gehele jaar goed licht ontvangen.

Ook vensterbankwekers kunnen goed en veel succes met deze soort hebben. We kunnen deze planten namelijk zonder risico 's zomers op een zonnige, beschutte plaats hangen of zetten, waar we ze op zonnige dagen veel water geven met op gezette tijden ook wat bemesting in de normale dosering,

's Winters hangen we ze op een koele, droge en zeer lichte plaats zonder een druppel water, wanneer tenminste de relatieve luchtvochtigheid niet te laag is, d.w.z. tussen de 70 en 90%. Is het veel droger, dan doen we er goed aan om van tijd tot tijd een klein beetje te nevelen (b.v. 1 x per 14 dagen) om te sterke uitdroging te voorkomen.

Blokcultuur bevalt het beste, ook wanneer we deze soort op de vensterbank kweken en dan is de wisselcultuur dus de aangewezen methode.

Deze *Laelia* bloeit in de late herfst tot in de vroege winter.





Tekening: L.J.M.Janssen

L.J.M. Janssen
oktober 1985