

## **Cattleya cinnabarina (Bateman ex Lindl.) Van den Berg**

Synoniem: *Laelia cinnabarina* Batem, ex Ldl.

### **Vindplaats:**

Het gebied waar deze mooie *Laelia* voorkomt bevindt zich in de provincie Minas Gerais en Rio de Janeiro (Zuidelijk Brazilië). Ze groeien ook vaak lithofytisch (op rotsbodem) op hoogten van 500 en 1300 m boven zee. Een streek met zeer veel ruwe kalksteen formaties; vaak heel moeilijk begaanbaar terrein.

### **Omschrijving:**

De pseudobulben zijn cilindervormig, van onderen vrij dik en afgerond, 5-20 cm hoog of soms iets meer. De jonge opgroeiende bulb is omgeven door een dunne vliezige schede, die later bij het rijpen verdwijnt.

De bulben hebben één (zelden 2) leerachtig, puntig blad van ca. 25 cm lang. Als de plant op een zonnige standplaats staat, krijgen de bulben en ook de bladeren een paarsgroene kleurzweem. De eindstandige, zeer dunne bloemstengel van ongeveer 50 cm lang ontspruit uit een bloemschede en kan 5 tot vaak 12 bloemen dragen. De oranjerode bloemen zijn 5 a 7 cm in doorsnede. De buitenkant van de vrij smalle bloemblaadjes zijn iets minder fel gekleurd. De 3-lobbige lip is van de basis af buisvormig om het zuiltje gebogen; het voorste middendeel is sterk gekarteld en van binnen rood geaderd op een gele ondergrond.

De bloeitijd valt in het voorjaar tussen februari en april/mei. De bloemen blijven soms wel 6 weken goed.



### **Cultuur:**

Een plant voor een gematigde- tot gematigdwarme omgeving op een zeer lichte plaats waar 's zomers licht geschermd moet worden en 's winters de volle zon kan doordringen.

Potcultuur is aangewezen; in een mengsel van  $\frac{3}{4}$  varenwortel of dennenschors en  $\frac{1}{4}$  veenmos. Ook andere mengsels, waarbij gebruik gemaakt wordt van toevoegingen zoals brokkenturf en/of beukenblad zijn heel goed mogelijk.

Een normale bemesting vanaf enkele weken na de bloei tot in het najaar is heel bevorderlijk om forse planten te krijgen.

In de wintermaanden dient de plant heel spaarzaam gegoten te worden om de nieuwe scheuten te laten afrijpen. In die periode mag het grondmengsel best eens droog aanvoelen en bemesting is dan uit den boze.

Vooraf de zonnige plaats in de wintertijd zal de groei van de bloemstengel in het voorjaar sterk stimuleren; zo kan het zijn, dat in sombere winters met veel mist de plant niet in bloei komt. In die

gevallen kan men met dagelijks enkele uren kunstmatige belichting (na zonsondergang) proberen het gebrek aan licht op te heffen.

Deze 'gematigde' *Laelia* en ook de *Laelia flava* bijv. moet met de nodige zorg op een vensterbank of in de serre met succes te kweken zijn. De Mexicaanse *Laelia* soorten zijn wat gemakkelijker, omdat deze wat koeler staan.

december 1977