

1

**Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek**  
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden  
**Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg**

Synoniem : *Laelia crispata* (Thunb.) Garay



**Sectie *Parviflora***  
**Subsectie *Crispatae***  
**Basioniem *Cymbidium crispatum* Thunb.**  
**Synoniemen *Laelia rupestris* Lindl.**  
***Bletia rupestris* (Lindl.) Rchb.f.**

#### **Vindplaats**

Deze als plant slanke soort wordt gevonden in de staat Minas Gerais bij de plaats Diamantina op de rotsachtige, alpine gebieden van de Serra da Piedade, de Serra de Barão en de Serra Milagre in het zuidoosten van Brazilië. Ze groeien daar zuiver lithofytisch op ertshoudende rotsformaties. Deze soort heeft binnen de subsectie *Crispatae* het grootste verspreidingsgebied. Ze groeien op hoogten van 700 tot 1200 meter boven de zeespiegel in de volle zon.


#### **Omschrijving**

Deze soort heeft rechtop groeiende pseudobulben, sterk cilindervormig en aan de basis iets breder dan aan de bovenkant; de onderzijde is afgerond. De bulben zijn 12 tot 20 cm lang met aan de top van de bulb één smal, rechtop groeiend blad, stug en leerachtig; het blad is smal en blijft ook bij het ouder worden licht gevouwen en wordt ongeveer even lang als de bulbe; het is grijsgroen van kleur.

De bloemsteel aan het einde van de bulbe ontspringt uit een smalle lange spatha; deze bloemsteel wordt 2 à 3 maal langer dan het blad en heeft 3 à 5 bloemen, die los verspreid aan de top van de bloemsteel staan.

De bloemen zijn vlak en wijd geopend. Ze hebben een diameter van ca. 4 cm. De lip staat recht naar voren gericht en het uiteinde van de middenlob is sterk gekromd. De bloeitijd valt meestal in het voorjaar en de bloemen blijven lang in goede conditie op de plant.

## Cultuur



tekening L.J.M. Jansen

Een plant voor een gematigd-koele omgeving op een zeer licht plaats met grote temperatuursverschillen tussen dag en nacht. Indien de plant geen last heeft van verbrandingsverschijnselen staat ze het liefste in de volle zon en dit laatste zeer zeker gedurende de wintertijd.

Potcultuur is de aangewezen manier, met een mengsel van pure varenwortel en een klein beetje veenmos.

Erg belangrijk is om regelmatig wat dolocal in het gietwater te doen om de pH-waarde te verhogen.

Een regelmatige bemesting van het voorjaar tot in het najaar in de normale verhouding is prima! Gedurende de wintertijd minder water geven, maar nooit gortdroog, eigenlijk is de vochtigheid in de omgeving belangrijker, waardoor ook de potkluit nooit zo snel uitdroogt.

De nachtelijke wintertemperatuur mag gerust tot 8° à 10°C dalen.

L.J.M. Jansen