

Masdevallia instar Luer Andreetta 1978

Chr. Branger



foto Chr. Branger

Naam

De naam *instar* is afkomstig uit het Latijn en betekent evenbeeld, geheel als, of ongeveer. Dit duidt er op, dat hij op een andere *Masdevallia* lijkt en wel op *M. triangularis* Lindl. Daarom behoort hij bij de sectie *Triangulares* Krzl, door anderen sectie *Caudatae* Veitch genoemd.

Vindplaatsen

Deze plant komt voor in Ecuador, in de regenwouden van Cajanuma op een hoogte van 2500 tot 2700 m. Andreetta vond hem in juli 1973, hij kweekte hem op en de plant bloeide in juli 1977 in Cuenca. Hij is ook in Peru aangetroffen, maar de vindplaats daar is niet meer bekend.

Beschrijving

De plant is van middelmatige grootte: hij groeit epifytisch en is zoals verreweg de meest *Masdevallia*'s zodevormend.

De bladeren staan rechtop en zijn leerachtig, 6-11 cm lang met inbegrip van het 1,5-3 cm lange bladsteeltje, en 2 cm breed. De top van het smal-eivormige tot elliptische blad is drietandig.

De bloemstengel draagt 1 bloem, is 6-11 cm lang, terwijl het bloemsteeltje 1 à 2 cm lang is, zodat de bloemen wat boven de bladeren uitsteken.

De sepalen zijn geel, aan de binnenkant zitten fijne roodbruine stipjes. De staarten zijn geel-bruin en 2-5 cm lang. De sepalen zijn tot op een halve centimeter met elkaar vergroeid, zodat de bloem een vlakke indruk maakt. De plaat van de sepalen gaat vrij abrupt over in de staarten, die rechtop en zelfs wat naar achteren staan. De dorsale sepaal is wat ovaal en 1,5 bij 1,3 cm. De laterale sepalen zijn wat kleiner. De petalen zijn wit en 0,6 bij 0,2 cm groot: de afgeknotte top is tweelobbig met een klein puntje tussen die lobben. De lip is ongeveer 0,5 cm lang en 0,3 cm breed, creme-kleurig, met wat purperen stipjes en in het midden een zwelling; de top is wat teruggeslagen. De zuil is stevig, wit van kleur, afgezet met purper, 0,5 bij 0,3 cm groot.

Verwisselingsmogelijkheden

Zoals gezegd lijkt hij op *M. triangularis* Lindl. Hij verschilt daarmee, doordat de hoek, die de verbinding van de sepalen maakt bij *M. triangularis* wat stomper is dan bij *M. instar*. Hij lijkt ook op *M. xanthina* Rchb.f. Een verschil daarmee is de ellipsvormige lip met een insnoering juist onder de afgeknotte top bij *M. instar*.

Cultuur

Daar de plant uit gebieden tussen de 2500 en de 2700 m komt, moet hij koel gekweekt worden. Hij maakt zijn slechtste tijd door in onze zomer, wanneer de temperatuur buiten boven de 22 °C komt. Door goed te schermen kunnen we proberen de temperatuur in onze kas onder de 25 °C te houden. Te vochtig bij die hoge temperaturen is ook niet goed, want dan treedt al snel verrotting en verslijming op.

Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

We potten op in een luchtig mengsel, wel zoveel mogelijk plantaardig. Wat piepschuimkorrels mag wel, maar dat mag niet overheersen. Verpotten om de 2 jaar is aan te bevelen. We moeten eerder verpotten, als we zien, dat de plant niet groeit of de potsubstantie er slijmerig of bedorven uitziet. Fijne bark in het mengsel doet de planten vaak goed.

In september begint de goede tijd voor onze planten; de buitentemperaturen worden dan lager, zodat ze het wat koeler krijgen en we dan ook wat meer licht kunnen toelaten.

December 1981