

Maxillaria paranaensis Barb.Rodr.

Synoniem.:

- *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne
- *Maxillaria heterophylla longifolia* Hoehne

Vindplaats:

Deze plant wordt vooral gevonden in de bergstreken van de provincie Sao Paulo (Brazilië) op hoogten van 1500-2000 meter boven zee; een koel vochtig bergklimaat met zon en vaak mist of nevels. Dit kleine plantje is benoemd door de Belgische botanicus en systematicus Alfred Celestin Cogniaux (1841-1916), die zeer vele Braziliaanse orchideeën beschreef waarvan er ettelijke zijn naam dragen. Het geslacht *Maxillaria* met ongeveer 300 soorten komt over een groot gebied in de Amerikaanse tropen voor.

Omschrijving:


Deze *Maxillaria* behoort tot de z.g. minia-tuurtjes, een groep hele kleine orchideetjes, waarvan er in de verzameling van elke rechtgeaarde orchideeën-liefhebber wel enkele exemplaren te vinden zijn.

Het is een kleine epifiet, die groeit op bomen met een dikke bast tussen allerlei mossen.

De pseu-dobulbjes zijn 3 bij 5 mm, dicht naast elkaar groeiend op de wortelstok.



Foto: J. Lodewijk



Tekening J. Lodewijk

De 2 blaadjes zijn 5 tot 7 cm lang en 2 á 3 mm breed, net als dennenaalden; donkergroen. De bloemstengeltjes verschijnen na uitrijping van de nieuwe groei en hebben een omhullend vliesje.

De bloemetjes zijn ½ bij 1 cm groot, licht of donkerbruin met glimmend donker lipje. Ze geuren niet.

De bloeitijd begint in maart of wat later en duurt ongeveer 2 weken.

Cultuur:

Een plantje dat in de koele kas of op een koele plek in de gematigde kas gekweekt kan worden.

Het gebruik van een stenen potje of opgebonden op een acaciastam-metje met een osmunda/veenmos ondergrond geven even goede resultaten.

Het mengsel voor potcultuur zou uitsluitend uit ½ osmunda of mexifern en ½ veenmos kunnen bestaan.

Een plaats in de halfschaduw tussen de andere planten in de koele kas is het beste. Er moet een frisse luchtstroom langs kunnen gaan.

In de groeitijd moeten deze kleine plantjes regelmatig gegoten en geneveld worden vooral op warme zomerdagen; 's winters iets droger houden maar wel sproeien tegen uitdroging.

Met het geven van vloeibare meststoffen, uiteraard alleen in de zomer, moet men heel voorzichtig zijn. De helft van de concentratie, dus ½ g/liter 2 x per maand is ruim voldoende. Het is logisch, dat de hele kleine orchidee-tjes speciale aandacht moeten krijgen bij het kweken; ze drogen sneller uit en de tere worteltjes zijn heel kwetsbaar bij het verplanten of bij overmatig gieten.

Als de omstandigheden in huis of in een serre gunstig zijn moet het mogelijk zijn dit soort plantjes te kweken.

Een kamerkas met ventilatortje erin zal zeker voldoen.

Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

augustus 1977