

Odontoglossum constrictum Lindl. 1843

Synoniem

Oncidium constrictum (Lindl.) Beer 1854
Odontoglossum sanderianum Rchb f. 1881
Odontoglossum boddaertianum Rchb f. 1888

Vindplaats

Deze *Odontoglossum* komt voor in Venezuela en Colombia, groeit daar epifytisch in bomen die veel licht krijgen op een hoogte tussen de 1700-2400 meter waar altijd een briesje staat.

Beschrijving

O. constrictum heeft glimmend groenbruine pseudobulben welke de afmeting hebben van 4-8 cm, deze zijn langwerpig-ovaal, onderling verbonden door korte houtachtige rhizomen. Bulben dragen meestal 2 bladeren, lancetvormig toegespitst (3 ½ - 28 cm), waarvan de midden nerf aan de onderzijde scherp is.

De bloeistengel komt uit het laatste schutblad en wordt tot 35 cm lang, is dikwijls sierlijk gebogen en draagt 12-20 licht geurende bloemen, soms meer, variërend in grootte van 4-7 ½ cm. Petalen lancetvormig spits, gegolfd, geelgroen, van binnenuit bruinrood streepvormig gevlekt. De sepalen hebben dezelfde vorm, maar zijn meer gevlekt. Lip vioolvormig met getande randen, kleur wit met roodbruine vlekken.

Callus voorzien van 2 kielvormige obstakels. Het zuiltje is licht gebogen, roomwit van kleur, met aan de beide uiteinden een 5 mm lang draadvormige aanhangsel.



Cultuur

Deze *Odontoglossum* zal het beste groeien bij een minimum temperatuur in de winternacht van 12°C (overdag iets meer), en een maximum tijdens de zomerdag van 25°C, liefst niet hoger. Kan vrij licht gekweekt worden, maar dient wel altijd vochtig te staan. Tijdens de bulbvorming kan men iets minder water geven om de bulb beter te laten rijpen en mede een prikkel te geven tot bloemvorming, en zodoende één of zelfs twee bloeistengels te laten voortbrengen. Zelf heb ik de plant opgepot in een plastic pot gevuld met water opnemende steenwol, waarover ik uiterst tevreden mag zijn. Regelmatig wat bemesten in de groei periode is aan te bevelen. Opletten voor spint.

Ik zou deze plant niet aanbevelen voor de huiskamercultuur.

Kan zomers wel in de tuin verzorgd worden.

Bloeitijd

De bloeitijd is nogal variabel. De plant kan eigenlijk elke maand van het jaar bloeien, met als hoogtepunt de wintermaanden.

Wetenswaardigheden

Odontoglossum constrictum is voor het eerst gemeld uit La Guarya en Caracas waar ze in 1843 werd gevonden door de Belg Linden en vervolgens verscheept naar Engeland alwaar de plant in dat zelfde jaar werd beschreven door John Lindley. In 1881 werd *Odontoglossum sanderianum* beschreven door Reichenbach. Deze plant had aanzienlijk grotere bloemen dan *Odontoglossum constrictum* maar bij nadere bestudering bleek dat dit toch ook weer een *Odontoglossum constrictum* was die eerder is beschreven als variëteit *majus* door Lindley in 1852.

Bron:

Orchiteek N.O.V.

Bijlage van Orchideeën juni 1987

Tekst: Jan Schoonen

Foto: A. Klaassen