

Rossioglossum ampliatus (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Synoniem: *Oncidium ampliatus* Lindl.

Vindplaats:

De Midden-Amerikaanse staten Guatemala tot en met Panama. Bovendien Venezuela, Colombia, Ecuador en het noorden van Peru. Ook op het eiland Trinidad voor de kust van Venezuela. Ze groeien daar in het heuvelland tussen 150 en 350 meter boven zee.

Omschrijving:

De dichtopeen groeiende pseudobulben zijn bijna rond, sterk afgeplat en overlans gegroefd en meestal bezaaid met paarsbruine vlekjes. Ze kunnen 6 tot 10 cm hoog worden en dragen 2 leerachtige bladeren van ca. 30 cm lang en 7½ cm breed.

De soms vertakte bloemstengel kan een meter lang worden en draagt vele bloemetjes van 2½ - 3½ cm doorsnede; nogal variabel in grootte dus. Ze zijn kanariegeel en aan de basis van petalen en sepalen rood gespikkeld. De petalen zijn veel groter dan de sepalen. De grote lip is breder dan lang en in het midden ingesneden.

De bloeitijd valt in het voorjaar, maar dit kan nogal eens verschillen bij diverse exemplaren; het is vaak afhankelijk van het land van herkomst.



Foto: J. Lodewijk



Tekening: J. Lodewijk

Cultuur:

Een plant voor een gematigd- tot warmgematigd klimaat op een plaats, waar in de zomer iets geschermd moet worden op de zonnigste middagen.

Bij potcultuur moet een naar verhouding kleine stenen pot gebruikt worden. Bij het gebruik van plastic potten dient men het gieten hieraan aan te passen.

Belangrijk is bij deze *Oncidium* en bij nog een aantal zg. "lastige" soortgenoten, dat men het potmateriaal aan de droge kant moet houden, zeker in de periode buiten de groei dus bij ons de winter. Vandaar de kleine stenen pot, die eerder opdroogt dan het plantmateriaal in plastic.

Als potmengsel voldoet 4/5 deel varenwortel of dennenschors met een beetje (1/5) veenmos erbij heel goed.

Vele amateurs zetten deze plant op een mexifern blokje. Dit geeft ook goede resultaten met minder kansen op moeilijkheden. Eén van die moeilijkheden water tussen de kleine blaadjes krijgt en dit niet tijdig vóór de avond is verdampt. Krijgt men per ongeluk toch water op de

jonge blaadjes dan is het raadzaam de gehele plant ondersteboven te houden en de druppels eruit te schudden, 's Ochtends gieten op zonnige dagen voorkomt alle moeilijkheden op dit gebied. Zijn de scheuten groter en goed beworteld dan is de kans op rotting al heel klein geworden.

Een lichte bemesting in de groeiperiode geeft vaak goede resultaten.

Als de plant in een pot gekweekt wordt, is verpotten om de 2 jaar wel geboden. Dit moet dan na de bloeitijd gebeuren. Op blokjes gekweekt kan deze *Oncidium* vele jaren achtereen gedijen en tot een grote plant uitgroeien.

Het splitsen van planten in stukken van 3 á 4 bulben of nog minder geeft meestal teleurstellingen. Met minimaal 5 achter-bulben in de periode na de bloei is deze handeling het minst schadelijk.

Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Met de nodige zorg kan *O. ampliatus* een goede kamer- en serreplant zijn -mede door het feit dat hij betrekkelijk "droog" gekweekt moet worden, maar wel met een goede luchtvochtigheid.
februari 1978