

Rhynchosele cervantesii (Lex.) Soto Arenas & Salazar

Synoniem :

- *Odontoglossum cervantesii* Llave en Lex
- *Odontoglossum membranaccum* Lindl

Naam

Deze plant ontving zijn naam in 1825 van de beide Mexicaanse botanici C. P. de la Llave en J. M. de Lexarza.

Later (1838) beschreef Lindley een plant onder de naam *O. membranaceum*. Dit bleek echter een variëteit van *O. cervantesii* te zijn. In 1993 heeft de plant zijn huidige naam gekregen.

Deze orchidee is genoemd naar een professor in de plantkunde in Mexico n.l. N. Cervantes.

Loddiges bracht deze *Odontoglossum* naar Engeland.

Verspreidingsgebied

In veel provincies van Mexico komt hij voor. Hij wordt dan vaak gevonden met o.a. *O. nebulosum* Lind. en *O. maculatum* Llave en Lex. De plaatsen waar bij voorkomt, liggen allemaal gemiddeld zo'n 2400 meter hoog.

Hij groeit daar dan epifytische op bemoste stammen van oude dennenbomen in halfschaduw of helemaal in de schaduw.

De zomers in die streken zijn regenrijk en de winters vrij droog.

Omschrijving

De pseudobulben staan dicht opeen gedrongen bij elkaar en zijn een centimeter of 5 groot, terwijl ze wat samengedrukt en eivormig zijn.

Ze dragen één blad van hoogstens 15 cm groot.

De bloemstengel verschijnt onderaan de stengelknol en krijgt 3 tot 6 bloemen, die ca 6 cm groot zijn. De sepalen en petalen zijn wit en hebben overdwarse bruine streepjes aan de basishelft van de bloembladen. Ook de lip is vaak wat overdwars gestreept aan de basis.

De bloeitijd van de plant valt tussen december en april. De bloemen zijn ongeveer 4 weken houdbaar.

Cultuur

Daar *O. cervantesii* uit de bergen komt, ligt het voor de hand, dat bij in de koele kas gekweekt moet worden. Daar ligt de temperatuur 's nachts tussen de 8 en de 12 EC. De dagtemperatuur mag oplopen tot circa 26 EC.

Hij prefereert een schaduwrijk plekje.

Als je deze toestand kan bereiken is het een ideale groeier en bloeier. Vooral voor de schaduw is hij erg dankbaar.

Cervantesii's kunnen zowel in potten als op blokjes gekweekt worden.

Ook op de vensterbank gelukt de kweek uitstekend.

Bij het opkweken in potten verdient het voorkeur om waterdoorlatend substraat, zoals mengsels van varenwortel, veenmos en geknipte beukenblad. Kweekt men ze op een varenblokje, dan moet men er wel voor zorgen, dat de plant genoeg water krijgt.

Wat mest gedurende de groeitijd eens in de veertien dagen doet de plant lekker groeien.

Chr. Branger

NOV oktober 1981