

## **Trichoceros antennifer (H&B) HBK 1816**

### **Synoniem**

*Epidendrum antenniferum* H&B 1808  
*Trichoceros parviflorus* HBK 1816  
*Trichoceros armillatus* Rchb.F. 1856  
*Trichoceros muscifer* Krzl. 1906

### **Vindplaats**

*Trichoceros antennifer* is afkomstig uit de Andes; Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru. Het geslacht bestaat uit ±5 soorten. Groeit terrestrisch op plakken mos en soms op rotsen. De hoogte waarop deze soort groeit is 1800 - 2600 m.

### **Beschrijving**

De plant bezit korte rhizomen met daarop grijsgroene, kleine, samengedrukte bulben die zich in de as van vlezige en hard grijsgroene blaadjes ontwikkelen. De slanke bloemstengel, de lengte is ±40 cm, is meerbloemig en ontstaat aan de basis van de bulbe. Petalen en sepalen zijn van

vorm ongeveer gelijk, groen gelig van kleur en voorzien van 'n rode tekening, de petalen zijn meer getekend dan de sepalen. De lip is baardvormig, rood van kleur en voorzien van twee aanhangsels; callus en zuiltje zijn behaard. De bloem staat normaal op de stengel, dus niet zoals bij de meeste orchideeën bloemen omgedraaid (geresupineerd).



### **Cultuur**

*Trichoceros antennifer* heeft een frisse omgeving nodig. Alleen water geven als de luchtige potkluit opgedroogd is. Minimum temperatuur 6°C, maximum 25°C. De plant verdraagt vrij veel licht, maar in de zomer toch iets geschermd houden. Gelet op de omstandigheden van de natuurlijke standplaats waarschijnlijk binnenshuis slecht te kweken.

### **Bloeitijd**

Heeft geen vaste bloeitijd. Bloeit op de volwassen scheut.

### **Wetenswaardigheden**

De soortnaam (antennifer = aanhangsels dragend).

### **Bron:**

Orchitheek N.O.V.  
Bijlage van Orchideeën juni 1990  
Tekst: J.A.C. Schoonen  
Foto: J.A.C. Schoonen