

## Vanda coerulea Griff.



Deze Vanda werd voor het eerst in 1837 door Griffith ontdekt in het Khasia gebergte (Assam, India) en later, in 1850, samen met een groot aantal andere orchideeën door de plantenverzamelaar Th. Lobb naar de kwekerij van Veitch in Engeland gestuurd.

### Vindplaats:

Behalve in het Himalaya gebergte ook in Burma, speciaal het Moulmeingebied, en Thailand overal op hoogten van 1000-1500 meter boven zee

### Omschrijving:

Een stevige stam tot ca 11 meter hoogte met leerachtige waaiersgewijs gerangschikte geelgroene bladeren. Deze zijn 25 cm lang en 2 ½ cm breed. Enkele dikke, soms vertakte vlezige "luchtwortels" houden de

plant in evenwicht. Eén of meer bloeistengels van ongeveer 40 tot 50 cm lengte verschijnen in het najaar of in de winter. Zij kunnen tot 15 bloemen dragen.

De kleur kan, afhankelijk van de streek van herkomst, variëren van lichtblauw tot wit. Maar ook de groeiomstandigheden kunnen de kleurintensiteit beïnvloeden (zie Cultuur). De bloemen hebben een doorsnee van 7-9 cm, zijn in het algemeen lichtblauw met een donkerder blauwe tekening. De donker paarsblauwe lip is naar verhouding heel klein en heeft witte zijlobben.

### Cultuur:

Een plant voor de koele tot koelgematigde kas, waar het typische bergklimaat enigszins nagebootst kan worden.

Voorwaarden voor succes bij deze plant zijn: een zeer lichte koele omgeving waar een frisse vochtige lucht in beweging is (ventilator).

Op warme zomerdagen moet men proberen met nevelen en iets meer schaduw de lucht zo koel mogelijk te houden. Stilstaande lucht is funest voor deze- en vele andere Vanda's, maar eigenlijk ook voor alle planten uit de bergstreken.

Vaak staan Vanda's in stenen potten met louter grove osmunda of grove brokken dennenschors, maar ook wel in houten kratten. Beide methodes voldoen goed. Het is van belang, de

planten niet aan het tablet met hun wortels te laten vastgroeien om ze zonodig gemakkelijk te kunnen verplaatsen. Dit i.v.m. de mogelijkheid de meest geschikte plaats te vinden in de zomer of in de winter. Bij Vanda's bevinden de meeste wortels zich als "luchtwortels" buiten het oppotmateriaal. De enkele wortels die in de pot of krat zitten houden de stam recht.

Deze Vanda kent geen rusttijd, dus mag het gehele jaar gegoten, en geneveld worden en 's zomers ook bemest met vloeibare meststoffen.



Het potmateriaal moet om de 2 jaar voorzichtig ververs worden. Van groot belang is om de planten in de zomermaanden een zo koel mogelijke plaats te geven. Hierdoor verkrijgt men donkerder blauwe bloemen dan in het geval dat de plant het te warm heeft gehad.

De bloei valt meestal in de maanden oktober-november.

Als men in huis of in een serre de beschreven omstandigheden kan geven zal degene zonder kas ook van deze prachtige Vanda kunnen genieten.

juni 1976