

Profiel van een onbekende orchidee
CONDYLAGO RODRIGOI LUER



Condylago, heeft u die geslachtsnaam al eens eerder gehoord? Ik vermoed van niet. Toen ik deze soort fotografeerde, zag ik hem voor het eerst. Wil je daar wat meer over weten dan kom je meestal in de boekjes van Luer terecht. In dit geval Icones Pleurothallidarum deel 4, uit 1987.

Het geslacht Condylago bestaat uit één soort: *C. rodrigoii*. Deze soort is vernoemd naar de kweker die hem voor het eerst in bloei kreeg: Sr. Rodrigo Escobar R. in Medellin Columbia. In 1982 werd *C. rodrigoii* door Luer beschreven. Hij gebruikt de geslachtsnaam Condylago omdat dit zinspeelt op de verbinding van de lip met het zuiltje.

Het volledig andere mechanisme van de gevoelige lip maakt van deze soort een apart genus. Er zijn nog twee geslachten die een zeer beweeglijke lip hebben: *Acostea* en *Porroglossum*. Deze geslachten zijn niet direct met elkaar verwant.



De plant lijkt veel op een bekende Pleurothallis: *P. flexuosa*. Het opvallende aan beide soorten is de lange bloeistengel, die wel 25 cm kan worden, en waaraan bloemen successievelijk opengaan. De bloemen zijn even groot, 2 cm en hebben beide de opvallende haartjes. Alleen de lip wijkt duidelijk af, dus geen directe relatie.

Condylago rodrigoii wordt in Colombia tussen 1.400 en 1.600 meter gevonden, in vochtig woud. Een indicatie om hem gematigd tot koel te kweken.

Tekst & foto's: A. Klaassen

