

## Catasetum planiceps

### Vindplaats:

Het geslacht *Catasetum*, met ruim 110 soorten, is verspreid over geheel tropisch Amerika vanaf Mexico tot aan Peru. *C. planiceps* wordt gevonden in de staten Columbia, Venezuela en de 3 Guyana's, dus ook Suriname, en het noordelijk deel van Brazilië.

### Omschrijving:

De pseudobulben zijn langwerpige cilindrisch en geheel bedekt met dorre dunne vliezige bladscheden en kunnen een lengte bereiken van ca. 25 cm.

Een bulb kan tot 9 elliptische bladeren dragen, die in een punt uitlopen. Deze zijn tot 37 cm lang en 8 cm breed en hebben 3 uitgesproken nerven.

De bloemstengel ontspruit aan de basis van de bulb en is met enkele bracteeën omgeven en kan een lengte van 45 cm bereiken. De bloeiaar bestaat uit 4 tot 9 gelige, losjes gerangschikte bloemen. Zelden zijn er meer dan 9. De kleur kan nogal variëren naar geelgroen tot lichtgroen, soms zelfs rozeachtig met bruine spikkels. De sepalen en petalen hangen min of meer omlaag en zijn ca. 3,6 cm lang terwijl de vlezige bolvormige lip omhoog staat. De kleur hiervan kan variëren van groen tot oranjebruin. Het zuiltje heeft een merkwaardige vorm; knotsvormig, stomp en aan de voorzijde voorzien van 2½ cm lange uitsteeksels.



### Cultuur:

Een plant voor de warme- tot gematigd warme kas op een plaats waar het zonlicht  $\frac{3}{4}$  van het jaar onafgeschermd kan doordringen.

Alleen in de maanden juli, augustus en september moet in de middaguren op heldere dagen iets geschermd (25%) worden. Daarbij moet men proberen de relatieve vochtigheid in de zomer maanden zo hoog mogelijk te houden, want dit is de tijd dat de nieuwe scheut zich ontwikkelt.

Het kweken in een pot heeft enkele voordelen boven een varenblokje of iets dergelijks. Het mengsel waarin *Catasetums* behoorlijk groeien, bestaat voornamelijk uit osmunda of mexifern met enkele plukjes veenmos en wat beukenblad. De bloei valt meestal in het voorjaar, maar kan ook wel iets later in de zomer komen.

Gedurende de winter verliezen de meeste *Catasetums* hun bladeren. In het vroege voorjaar is het van belang om de pot van vers materiaal te voorzien in de periode, dat de jonge loot verschijnt maar deze nog niet is beworteld, waardoor geen wortelbeschadiging kan plaats vinden.

De bloemstengel komt vaak tegelijk met de nieuwe scheut te

voorschijn. Na de bloei die betrekkelijk kort duurt, ontwikkelen zich de bladeren en vormt zich uiteindelijk de nieuwe bulb.

In deze tijd, zomer en herfst, kan de plant best een vloeibare bemesting verdragen.

Gedurende de winter moet de plant volledige rust hebben en dus geheel droog staan. Het blad vergeelt in het begin van de winter en valt tenslotte af. *Catasetums* zijn in het algemeen niet zo moeilijk in bloei te krijgen.

Als men op de vensterbank of in een serre op een zeer lichte plaats voldoende luchtvochtigheid kan bereiken en jaarlijks vers potmateriaal geeft is *C. planiceps* hiervoor zeker een interessante plant.