

Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins

Synoniem: *Cattleya aurantiaca* (Batem. ex Ldl.) P.N. Don.

Naam:

Samen met een aantal andere 2-bladige Guarianthes heeft deze een zeer nauwe verwantschap met het geslacht *Epidendrum* en *cattleya*. In oudere boeken zal men daarom moeten zoeken bij *Epidendrum aurantiacum* (Batem. ex. Ldl).

Vindplaats:

Vooral in de bergen van Mexico, Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Honduras, maar niet op al te grote hoogten.

Omschrijving:

Pseudobulben lang en slank, tot 40 cm hoog, omgeven door vliezige scheden. Twee langwerpige, stompe, vrij stugge bladeren. Bloemstengel kort met 2 tot 10 oranjekleurige bloemen met vrij korte stelen, bloemen 3 tot 4 cm in doorsnee. Lip schuitvormig naar beneden gebogen met kleine donkere spikkels. De bloemen kunnen bij sommige exemplaren vrij flets-oranje zijn en niet geheel open gaan. Waarschijnlijk heeft men dan te doen met een natuurlijk hybride nl.:

G. aurantiaca x *G. skinneri*, die ook vaak in catalogi wordt aangeboden onder de naam *C. aurantiaca*.



Cattleya aurantiaca

Cultuur:

In cultuur wijkt dit soort niet zo sterk af van de andere soorten uit de groep van 2-bladige *Cattleya*'s. Wel brengt de bloei in het vroege voorjaar mee, dat men de plant na de groei in de zomer en het volwassen worden van de nieuwe scheut in de herfst, gedurende de winter zeer matig moet gieten. De scheut kan dan afrijpen en ca. eind januari verschijnt de bloemstengel met de knoppen, die in februari/maart open gaan. De meeste andere 2-bladige *Cattleya*'s (*Guarianthes*) bloeien in de zomer en herfst.

De groei van *G. aurantiaca* begint dus veel later. Gedurende de winter moet de plant een gematigde temperatuur hebben en veel licht. De bloeispit blijft vaak lichtgroen totdat de bloemknoppen verschijnen, maar als deze spat bruin wordt en verdord lijkt hoeft dit niet te betekenen, dat de bloei achterwege blijft. In de groeiperiode is bemesting (visemulsie of een chemische mest zoals Petersmest) volgens het normale schema gegeven (1 x per 14 dagen) heel bevorderlijk. Verpotten moet bij alle *Cattleya*'s (*Guarianthes*), indien in pot gekweekt, 3/4 *osmunda* - 1/4 *sphagnum*, gemiddeld eens per 2 jaar geschieden. Belangrijk is er op te letten, dat dit gebeurt vóórdat de nieuwe wortels verschijnen omdat *Cattleya* (*Guarianthes*) heel gevoelig is voor wortelbeschadiging bij het vormen van de nieuwe scheut een paar weken na de bloei. Indien men de plant een goede plaats aan het raam kan geven met een gematigd klimaat is het kweken als kamerplant zeer wel mogelijk.