

Cirrhaea fuscolutea Lindl

Synoniem: *Cirrhaea saccata* Lindley

Synoniemen: *Scleropteris flava*

Verspreiding:

Endemisch in Brazilië. Groeit epifytisch in open maar vochtige bossen op hoogten van 800-1000 m.

Naamgeving:

De geslachtsnaam *Cirrhaea* is afgeleid van het Latijnse woord voor rank of krul, vermoedelijk verwijzend naar de vorm van de lip; *saccata* naar het Latijn voor zakvormig, naar de vorm van de middenlob van de lip.

Variëteiten:

Deze soort schijnt slechts voor wat betreft de grootte van de bloemen en de lengte van de bloeistengel enigszins te variëren. De voor de soort bepalende elementen blijven echter onveranderd.

Verwisselingsmogelijkheden:

Verwisselbaar is *Cirrhaea saccata* niet. Naast verwante soort is *Cirrhaea longiracemosa* Hoehne. Die heeft kortere en stompere zijlobben van de lip en de middenlob is duidelijk van

de zijlobben gescheiden en kleiner. Verder heeft deze soort - zoals de naam ook aangeeft - bloeistengels tot 40 cm lengte met wel 40 - 60 bloemen.



Cultuur:

Zoals alle *Cirrhaea*-soorten is ook *Cirrhaea saccata* een probleemloze soort.

Te kweken op een lichte, maar voor directe zon afgeschermd, plaats in de warme of gematigde kas, bij dagtemperaturen van minstens 18 °C en nachttemperaturen van minstens 16 °C.

De soort kent een duidelijke rusttijd na het volgroeien van de scheuten en na de bloei. In die tijd de plant wat lichter en wat koeler plaatsen. Slechts af en toe sproeien om te sterk verschrompelen van de bulben tegen te gaan. Wanneer na ca. 6 weken de jonge scheuten verschijnen kan weer meer gegoten worden en de temperatuur wat verhoogd worden.

Daar de bloeistengels naar beneden groeien is opbinden of kweken in een mandje aan te bevelen. Als substraat gebruiken we een goed doorlatend mengsel van houtskool, turfvezel, bark en wat beukenblad.

Gedurende het groeiseizoen moet het substraat steeds vochtig blijven, maar nooit langere tijd echt nat zijn! Stagnerend vocht leidt snel tot verlies van wortels en tot schimmelaantastingen.

Regelmatig bemesten gedurende de groeitijd, met een volwaardige meststof, met de helft van de voor groene planten aangegeven concentratie. Vermenging van oude koemest o.i.d. met het substraat moet afgeraden worden, daar de planten daardoor overvoerd zouden worden.

Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Cirrhaea kan gemakkelijk gedeeld worden zodra de nieuwe scheuten ca. 2 cm lang zijn. De deelstukken moeten minstens 2 bulben hebben.

Achterbulben kunnen opgekweekt worden door ze met wat vochtig sphagnum in een gesloten opgeblazen plastic zak op een warme plaats op te hangen. De plastic zak pas weer openen als een jonge scheut van een paar cm lengte gegroeid is.

Tot nu toe is Cirrhaea saccata in verzamelingen een kostbare zeldzaamheid gebleven, die toch wel af en toe aangeboden wordt en in de natuur niet echt zeldzaam schijnt te zijn.

Bron: Orchideenkartei. Die Orchidee november-december 1989

Tekst: R. Jenny. Vertaald en bewerkt door J.M.G. Bouwman.