

Dendrobium spectabile Miq. 1855

Synoniem

Latourae spectabilis Blume 1850
Dendrobium tigrinum Rolfe

Vindplaats

Irian Jaya (v/h Ned. Nw. Guinea), Papua New Guinea tot op de Salomons-eilanden. Bekende vindplaatsen waren Makbon, Ayamaroe-plateau, Arfak-gebergte, enz. Ze groeien dichtbij de kust en in bergstreken, tot op een hoogte van 900 meter. Veelal in streken waar veel neerslag valt; ze vragen vrij veel licht maar zelden de volle zon, dus lichte schaduw. Om zijn sterke groei en relatief makkelijke bloei is er na de eerst gevonden planten intensief jacht op gemaakt. Hierdoor waren ze na korte tijd zeldzaam geworden, bijna uitgeroeid.

Beschrijving

De groeiwijze is epifytisch, gehecht aan bomen (tot in de kruinen) of rotsen. De rechtop staande, 45-75 cm lange stengelachtige bulben staan op een kruipend rhizoom en dragen aan de top 4-6 korte, brede, lancetvormige bladeren. De kleur van de bulben is lichtgroen, geleidelijk verkleurend naar bruingroen, waarover een zilveren waas.

De bloemtak ontspruit uit de oksels van de bladeren, wordt 35 cm lang en draagt 8-12 bloemen. De vorm van deze bloemen is bizar, ze lijken op grote spinnen. De bloem is 8 cm in doorsnee, hij is spectaculair, grillig van vorm, gepaard gaande met mooie kleuren, lichtgeel met een paars lijnenspel en donkerpaars getekende lip en een bloeiduur van 8-12 weken, heerlijk geurend



Cultuur

Dendrobium spectabile is een plant die in de warme kas thuis hoort, op een lichte plaats, hoog in de kas, de groeizijde gericht naar het zuiden. Hij groeit dan goed en bloeit regelmatig. De bloeitijd valt in de nazomer, op overjarige bulben. Hij groeit goed op een mexifern/dicksonia paal of plank, het nadeel is dat ze snel uitdrogen. Een combinatie van een plastic pot met paal/plank mexifern of dicksonia is beter. Hiervoor gebruikt men een ronde, maar nog beter is een vierkante pot. Men bindt de kruipend groeiende wortelstok op de paal/plank, op die hoogte als de pot diep is. Hierna de

paal/plank tegen de rugkant van de pot plaatsen en de overblijvende ruimte opvullen met potmengsel; dit bestaat uit 5 delen middel bark, 2 delen gezeefde dicksonia of mexifern (grof), 2 delen steenwolvlokken grof (water opnemend), 1 deel zoutvrije, grove sphagnum. Stevig aandrukken, maar luchtig houden, niet vast persen. Na het op- of verpotten de plant gedurende 3 weken alleen over het blad nevelen (dagelijks). Gebruik hiervoor een oplossing van bestrijdingsmiddelen tegen Botritis (hartrot). Van de bekende middelen zoals Topsin M of Captan OC 83 enz. 1½ ml of 1½ g.l⁻¹.

Bemesting 1 x per maand gedurende het groeiseizoen, van de maand februari tot oktober. Past u chemische meststof toe, b.v. Peters orchideeën meststoffen, dan afwisselend 30-10-10 en 20-20-20, 1 g.l⁻¹, als bladbemesting. Wilt u organisch bemesten met b.v. visemulsie, dan de dosering zoals op de verpakking is aangegeven.

Bloeitijd

Nazomer, bloeiduur 8 tot 12 weken.

Wetenswaardigheden

Deze grootbloemige *Dendrobium*-soort is één van die soorten die praktisch uitgeroeid zijn. Deze orchidee werd voor het eerst gevonden door Latour Leschenault rond de jaren 1830/40. De eerste beschrijving werd gedaan door Blume in 1850 als *Latourae spectabilis* (publicatie in B. Rumphia 40, p41).

In het jaar 1855 werd de naam herzien. Dr. Miquel uit Utrecht beschreef (na diepgaand onderzoek) de plant opnieuw, hij bracht hem onder in het geslacht *Dendrobium*. Deze definitieve beschrijving werd gepubliceerd in Flora Indie Batave 1855, 3, p645 met afbeelding, onder de naam *D. spectabile* (vrij vertaald: spectaculaire bloem).

In Indonesië dragen zij de naam Larat 'tjoemi 'tjoemi (= lijken op inktvisjes).

Bron:

Orchiteek N.O.V.

Bijlage van Orchideeën juni 1986

Tekst: J.C. Koelewijn

Foto: J.C. Koelewijn