


## **Euchile mariae (Ames) Withner**

Synoniemen:

- *Encyclia mariae* (Ames) Schltr.
- *Epidendrum mariae* Ames



### **Vindplaats:**

Pas in juni 1935 werden de eerste exemplaren van deze planten gevonden door een Zweedse botanicus in het noordwesten van Mexico. Later werden, in 1937, in een ander gedeelte van Mexico nog meer planten gevonden en het zelfde jaar door Prof. Oakes Ames beschreven. Het is een plant, die in weinig streken en dan nog zeer plaatselijk veel voorkomt en dus in het algemeen schaars is in het land van herkomst. Ze groeien altijd op enige hoogte boven zeeniveau.

### **Omschrijving:**

Pseudobulben dicht opeen, langgerekt uivormig, grijs groen van kleur, tot ong. 4 cm hoogte dragen meestal 2

lichtgrijsgroene bladeren. De bloemstengel groeit tussen de bladeren uit aan de bovenkant van de bulb; is soms tot 15cm lang met 2 á 4 bloemen.

Petalen en sepalen zijn appelgroen, soms olijfgroen. Lip trompetvormig, naar verhouding heel groot, wit met nogal gegolfde randen. In de keel een langgerekte groene vlek. De bloem blijft lang goed en is zeer decoratief.

### **Cultuur:**

Een plant uit het gematigde klimaat, een langzame groeier, die niet zo gemakkelijk is als de meeste andere Epidendrams; hij moet het echt naar zijn zin hebben. Alle factoren: temp., licht, vocht, plantmateriaal moet optimaal zijn om een goed resultaat te krijgen. Zeer nadelig is bijv. als de plant te lang nat blijft, ondanks dat deze in ware regengebieden voorkomt in het land van herkomst. Het snel wegrotten van de wortels kan men voorkomen door gebruik te maken van een stammetje of een stuk schors waarop de plant wordt gewekt. Dit komt het meest overeen met de natuurlijke situatie.

Eiken of iepen of acaciahout en wat de schors betreft: kurkschors of populierenschors gaan ook jaren mee. Men moet bij het gieten er voor zorgen dat de plant volledig is opgedroogd alvorens weer gegoten wordt.

Overdag broesen (met de nevelspuitsproeien) op de bladeren is heel bevorderlijk. Wil men toch in een pot of mandje kweken dan moet een heel luchtig mengsel gekozen worden: van dennenbast of varenwortel en veenmos in de verhouding 4:1.

Oppottijd is het voorjaar, s'Winters wordt zeer matig gegoten en in de groeitijd, mei/sept., zijn de planten ook heel dankbaar voor bemesting, alleen dan als er voldoende wortels aanwezig zijn. De bloei is bijzonder mooi en zelfs kleine bulben kunnen reeds een bloemtakje geven.

Voor de kamer, als vensterbankplant, zal deze soort te veel problemen geven om plezier van te hebben.

