

Eulophia guineensis Ldl.



Vindplaats:

Op licht beschaduwde plaatsen in de humusrijke bodem van de bossen in Tropisch West-Afrika; d.w.z. vanaf Guinea tot Uganda, dus ook in Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo en Zaire.

Omschrijving:

Een terrestrische plant met ca 5 cm hoge, ei-vormige pseudobulben, die zeer dicht opeen groeien. Elke bulb draagt 2 á 3 bladeren van 40 tot 50 cm lang en ± 8 cm breed.

De bloemstengel ontspruit in het late voorjaar aan de voet van de bladerloze afgerijpte bulb van het vorige jaar.

Ongeveer tegelijkertijd of enige weken later ontwikkeld zich de nieuwe scheut ook aan deze bulb. Als de bloemstengel, in de zomer, zijn maximale lengte heeft bereikt dan is de scheut ongeveer 10 cm hoog. Tijdens de bloei groeit de scheut heel langzaam verder. De 10 á 15 lichtwelriekende bloemen zijn ca 5 cm hoog. De omhooggroeiende petalen en sepalen zijn donker groenpaars gekleurd en vaak iets gebogen. De grote middenlob van de lip is roze met een witte keel. In het midden zijn enkele donkerrose strepen. De zijlobben zijn wit-tot lichtroze. De bloei verloopt van onderen af. Als de bloemen zich aan de top van de stengel hebben geopend zijn enkele van de onderste bloemen reeds verwelkt; toch duurt de bloei ruim 6 weken. Hierna groeit de scheut verder totdat tegen de winter de bladeren geel worden en tenslotte afvallen.

Cultuur:

Een plant voor de warme kas op een plaats met 25% schaduw. De kweekwijze lijkt veel op die van de bekende bladverliezende *Calanthe's* (bijv. *C. vestita*). Jaarlijks in het voorjaar oppotten in een stenen pot waarin een mengsel van 1/3 varenwortel (of dennenschors), 1/3 veenmos en 1/3 verteerd beukenblad. Als aan dit mengsel wat verteerde stalmeest of gedroogde koemest wordt toegevoegd kan men zeer forse planten verwachten.

Zodra na de winterse rustperiode de nieuwe scheut en/of bloemstengel aan de voet van de bulb van vorig jaar verschijnt begint men, eerst heel voorzichtig, te gieten.

In de volle groei van de scheut kan de plant normaal 1 x per week gegoten worden.

Tegen de late herfst of winter als het blad geel wordt en afvalt moet een volledige rusttijd worden aangehouden totdat men de bulben in het voorjaar weer in vers materiaal gaat oppotten. Het is niet zo, dat men de bulben zoals bij *Calanthe's* van de wortel-stok kan afbreken en dan afzonderlijk weer oppotten. Bij *Eulophia* moeten 4 á 5 bulben aaneen een plant vormen.

Voor zover bekend zal de kweek van deze *Eulophia's* uit de warmste streken van Westafrika afkomstig, waarschijnlijk op de vensterbank teleurstelling geven.

december 1975

