

Miltonia clowesii Ldl.

Vindplaats:

Het gebied waar *M. clowesii* groeit beperkt zich voornamelijk tot de provincies Rio de Janeiro, langs de kust en Minas Gerais in Brazilië. Vooral op vrij schaduwrijke plaatsen dichtbij rivieren en watervallen in de heuvels, waar een gematigd klimaat heerst. De naam van deze plant is ontleend aan een zekere John Clowes, die in 1839 voor het eerst een in Engeland geïmporteerde plant in bloei kreeg.

Omschrijving:

De geelgroene pseudobulben van 7-10 cm hoogte dragen 2 glimmende, langwerpige puntige bladeren van 30-40 cm lang. De dunne lichtgebogen bloemstengel verschijnt in de herfst en heeft vaak 7-10 welriekende bloemen van ca. 7 cm doorsnee. De petalen en sepalen hebben een geelbruine kleur waarop kastanjebruine vlekken en dwarsstrepen. De lip is aan de basis voornamelijk purper, terwijl de uiteinden van de zijlobben wit zijn. De grote middenlob is geheel wit en hartvormig.



Foto: J. Pilkes



tekening: J. Lodewijk

Cultuur:

Een plant voor een omgeving met een gematigde temperatuur op een beschaduwde plaats (50 % schaduw), waar de vochtigheidsgraad van de lucht een belangrijke factor is.

M. clowesii is één van die *Miltonia*-soorten, die met evenveel succes op een varenblokje van mexifern gekweekt kan worden als in een plastic pot. In het laatste geval is de drainage van het mengsel een belangrijk punt. Dit bestaat dan meestal uit 50 % osmunda en 1/4 veenmos. Hierop zijn natuurlijk varianten mogelijk maar het moet in elk geval op tijd, om de 2 jaar verversst worden.

Miltonia's moeten het hele jaar vochtig aanvoelen. Ze kunnen in de groeitijd, als er vele nieuwe wortels aanwezig zijn, veel gietwater en ook een vloeibare mest verdragen.

Als men op een blokje kweekt kan dit 's zomers zeker 2 x per week gedompeld worden in de bak met gietwater. Het spreekt vanzelf, dat het gietwater op de temperatuur van de omgeving moet zijn. Water uit een steenkoude put, en dat niet enigszins is voorverwarmd kan op zomerse dagen bij dit soort planten grote schade aanrichten.

Er kan dan plotseling wortelrot optreden of een jonge loot kan ineens slijmerig worden en verloren gaan. In de, wintertijd, na de bloei, beperkt men natuurlijk het gieten zodanig dat de plant lichtvochtig aanvoelt en niet uitdroogt.

Ook voor amateurs, die in de vensterbank op het oosten (ochtendzon) of het noorden kweken en op een schaduwrijk plekje in de serre hoeft *M. clowesii* niet veel problemen te geven.

april 1977