

Oncidium heteranthum P&E

syn. *Oncidium bryoloptum* Rchb. f.
Oncidium ionops Cogn. en Rolfe
Oncidium megalous Schltr.

Naam

Er is een oude Costaricaanse naam die *Oncidium asparagoides* luidt. Deze naam is gevormd naar het natuurlijke uiterlijk van de plant, in het bijzonder van de bloeiwijze, die sterk op een *Asparagus*-plant (= Asperge) lijkt.

Verspreiding

Oncidium heteranthum heeft een groot verspreidingsgebied, dat loopt van Peru tot Costa Rica, hij komt in Venezuela erg veel voor. Grotere planten worden gevonden in vochtige bossen op ongeveer 1300 m en kleinere in lichte bossen tot ongeveer 1800 meter.

Omschrijving

Deze epifiet heeft 5 tot 15 cm hoge bulben, wat samengeperst, glad of lichtgegroefd, helder groen, twee bladeren, soms één. De bladeren zijn tot 15 cm lang en 2 cm breed, helder groen, tamelijk dun.

Bloeiwijze meestal tot 1 meter lang, vaak regelmatig vertakt, maar onregelmatig wanneer ze lang worden.

Abortieve bloemen geel; op kleine planten zijn de sepalen en petalen gelijk, op grotere planten gaan de bloemen verder open, zijn de petalen duidelijk kleiner dan de sepalen en is er ook een klein abortief vruchtbeginsel.

Sepalen en petalen zijn vaak geel met bruine strepen, sepalen 7X2 mm, petalen 7X4 mm. Lip tot 15 mm, helder geel met een paar bruine vlekken. Callus wit met een paar bruine vlekken, de basis waar het overgaat in de stempel-zuil is geel en bedekt met kleine, korte, dikke haartjes. Stempelzuil geel, met grote gele vleugels met gave kanten. Helmknop geel; aangename geur.



tekening J. Lodewijk



foto J. Lodewijk

Cultuur

De planten komen van hoogstens tussen 1300 en 1500 meter, wat wij voor een kasklimaat kunnen vertalen in gematigde kas: gemiddelde nachttemperatuur 12 °C . We zullen toch de planten op een lichte plaats moeten kweken, die dan gecombineerd moet worden met een hoge luchtvochtigheid, zonder dat de planten zelf drijfmat zijn.

Dit alles samengevoegd met een wat klimmende groeiwijze heeft mij doen besluiten de planten op blok te kweken.

In een pot met pure dicksonia gaat het ook uitstekend, maar de zeer dunne wortels laten zich op een blok makkelijker controleren. In de groeitijd hebben de wortels groene puntjes van wel 4 mm. Raakt de nieuwe bulb volgroeid dan de plant lichter en droger hangen. De uiteindelijke vorming van een bloemtak duurt soms wel twee maanden, maar daarvoor krijgt u dan ook wel

een meter(s) lange waterval van volgroeide en niet-volgroeide bloemen.

De bloeitijd valt in het najaar.

Regelmatige toediening van mest (3X per twee maanden in de groeitijd) doet hem goed: 1 gram per liter 20-20-20 of 10-30-20.

In de pot de planten groot uit laten groeien, wanneer echter ergens zomaar midden in de plant een bulb begint te rotten, ook al deelt u de plant er mee: direkt wegnippen.

A. Klaassen
december 1980