

Trichocentrum lanceanum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Synoniem: *Oncidium lanceanum* Lindl.



Vindplaats:

Colombia, Venezuela, de Guiana's, dus ook Suriname, en op Trinidad. De eerste exemplaren van deze prachtige *Oncidium*soort werden in 1834 door J.H. Lance in Suriname gevonden en naar Engeland overgebracht, waar ze een jaar later op de kwekerij van Loddiges tot bloei kwamen.

Omschrijving:

Een wortelstok met tot 10 cm brede en 40 cm lange stugge leerachtige bladeren.

Het blad heeft een lichtgroene kleur en is bezaaid met bruinrode spikkeltjes.

In mei/juni verschijnt aan de voet van het blad, in de vouw, de bloemstengel, die tot ca 50 cm hoog kan worden en tot 20 bloemen van 3 1/2 cm doorsnee kan hebben. De welriekende bloemen hebben een bijzondere kleurencombinatie: petalen/sepalen zijn geelgroen met donkerbruine stipjes en grotere vlekken, terwijl de lip met zijn violette tint hier sterk bij afsteekt. Er

komen in de natuur nogal wat verschillen in kleur van de lip voor. Van bijna wit tot donker-violet, maar altijd verlopend van kleur met het donkerste deel dan de basis.

De bloemen blijven lang goed en zijn ook zeer houdbaar op water in een vaas.

De wortel groei kan heel uitbundig zijn. Vele wortels groeien buiten het potmengsel naar alle zijden, zodat het lijkt of de plant op "stelten" staat.

Cultuur:

Een plant voor de warme kas met veel licht en een hoge luchtvochtigheid. Dus echt een plant voor een uitgesproken tropisch klimaat. Gematigd gekweekt gaat soms ook wel, maar de bloemstengels zijn dan veel minder fors.

Meestal worden stenen potten gebruikt of een houten kratje, hoewel het kweken op een varenblokje of stammetje goed mogelijk is. Bij potcultuur is een goede doorlatendheid van het plantmateriaal een eerste vereiste. Dit bereikt men met dennenbast of puur varenwortel.

Bij het gieten wachten tot het potmengsel is opgedroogd alvorens weer te gieten. Belangrijk is om de vele wortels, die zich boven de pot als ware "luchtwortels" gedragen niet op te vullen met potmateriaal of bij het verpotten onder het mengsel te verwerken. Dan treedt snel rotting op.

In de groeitijd, augustus/november, heeft de plant veel licht en ook een hoge luchtvochtigheid nodig en zal de nevelspuit er vaak aan te pas moeten komen.

In de winter treedt een zekere rustperiode in waarin heel weinig moet worden gegoten om het blad te laten afrijpen. In de maanden februari/maart kan alleen met de nevelspuit gewerkt worden. Dit is nodig want zonder een rusttijd krijgt men geen bloei.

Helaas is deze plant in het algemeen ongeschikt voor de huiskamer en serre.

Juli 1974

