

Renanthera imschootiana Rolfe.



Vindplaats:

In de heuvels -boven de 500 meter- in Vietnam, Laos, Burma en Assam (India); en vooral op open plekken in het bos of aan de bosranden.

Omschrijving:

Een dichtbebladerde dunne "stam", die tot een meter lengte kan uitgroeien. De leerachtige bladeren van ± 8 cm lengte groeien zijdelings in een vlak en zijn 2-lobbig aan de uiteinden. De bloemstengels kunnen 40 cm lang worden en dragen talrijke 3 á 4 cm grote bloemen. De dorsale sepaal en de 2 petalen hebben een gele onderkleur en

zijn met rode stippen bezaaid. De latere sepalen zijn veel groter en hebben een scharlakenrode- tot oranjerode kleur en zijn aan de basis enigszins gegolfd. Het kleine lipje is rood met gele kammen en voorzien van een kleine spoor. De bloem is stevig van structuur en blijft aan de plant zeker een maand goed. Ook afgesneden en in een vaas gezet zijn het sterke bloemen. De bloeitijd valt meestal in het voorjaar.

Cultuur:

Een plant voor een gematigd klimaat en een zeer lichte standplaats, die alleen tegen, de felste zomerzon geschermd moet worden. Hoewel men deze Renanthera weleens op een varenblokje ziet opgebonden en daarop succesvolle resultaten kan geven lijkt ons de cultuur in een pot te prefereren. Een stenen pot, die behalve voor 1/3 gevuld is met potscherven daarbij uitsluitend varenwortel (osmunda) of dennenschors (Fir-bark) bevat is beter en gemakkelijker. De plant zet zich vast met enkele stevige stugge wortels in de pot maar ook daar buiten bevinden zich enkele "luchtwortels". Bewortelde zijscheuten (stekken) bij grotere planten kunnen zonder schade worden afgesneden, opgepot en verder tot zelfstandige planten uitgroeien.

Deze Renanthera heeft geen rusttijd maar moet toch in onze wintermaanden weinig water hebben. Het gieten kan in de groeitijd - van april tot oktober - afgewisseld worden met een regelmatige gift van vloeibare meststoffen. De toediening van opgeloste meststoffen moet altijd vlak na het gieten gebeuren en dus altijd op reeds natte planten. Bij de eerstvolgende gieting mag dan geen mest gebruikt worden en hierbij wordt de plant juist schoongespoeld zodat eventuele uitgekristalliseerde zouten uit de mest weer met het gietwater uit de pot en van de plant verdwijnen.

In het algemeen zal deze Renanthera ook in een lichte serre of op de vensterbank (op het oosten of zuidoosten) en dan tussen andere planten in gemakkelijk tot bloei te krijgen zijn.

December 1975

