

## Vanda tricolor Ldl.



### Vindplaats;

Vooraf in bergterrein, tot op hoogten van 1500 meter op Java en Bali en op sommige kleinere Soenda-eilanden. Op Oost Java kunnen in de droge tijd gedurende augustus en september temperaturen van omstreeks het vriespunt tot soms 3 gr. onder nul voorkomen zonder dat er enige schade aan deze planten te zien is.

### Omschrijving:

Deze Vanda's kunnen uitgroeien tot zeer forse planten van een meter hoog en vaak met enkele zijloten. De in een waaivorm groeiende stugge leerachtige bladeren blijven jaren aan de plant.

De bloemstengels verschijnen in het najaar, bij volwassen planten, ca 30 cm onder de top uit de oksels van de bladeren. Deze dikke stengels worden meestal niet langer dan 25 á 30 cm en dragen 7-12 zeer welriekende bloemen van 5 tot 6 cm hoogte. Juist in de kleur en de tekening van de bloemen komen in de natuur vele variaties voor. Enkele daarvan zijn de var. *suavis* van Oost Java, met zijn langere bloemstengels en witte grondkleur en minder stippels op de petalen/sepalen, en de var. *purpurea*, die op het eiland Alor (ten noorden van Timor) inheems is. De soort zelf heeft een lichtgele ondergrond op petalen/sepalen en is bezet met vele paarsbruine stippels. De lip is paars. De bloemen hebben een stevige structuur en blijven lang goed.



### Cultuur:

Een plant voor de warme- of gematigd-warme kas op een zeer lichte, zonnige plaats, die alleen in de zomer tegen de felle zon beschermd moet worden.

De "stam" van de plant moet als deze hoog is ondersteund worden met een bamboe stokje, tenzij de dikke wortels vaak met vele zijwortels de plant overeind houden. De wortels groeien voor een groot deel buiten de potgrond en hechten zich aan het houtwerk in de omgeving of dringen in de aarde onder het tablet van de kas. Zij worden vaak meters lang. Grote forse planten zijn vaak niet meer verplaatsbaar zonder schade te doen aan de wortels.

Het meest gebruikte is een stenen pot met veel potscherven en uitsluitend grove dennenschors of alleen *osmunda* eventueel gemengd met stukjes houtskool waaruit blijkt hoe belangrijk een goede drainage is.

Gedurende de groeitijd, van april tot september, is een hoge luchtvochtigheid van groot belang.

Dus kan men 's zomers vaak met de nevelspuit werken en ook vloeibare meststoffen toedienen. In de wintermaanden moet het gieten sterk beperkt worden, maar het blad mag nooit verschrompelen. Over het algemeen ontstaan de bloemstengels in de late herfst of winter.

Bewortelde zijloten kan men met een scherp mes afsnijden en oppotten. De planten kunnen jaren achtereen in hetzelfde materiaal staan want de meeste wortels zijn buiten de pot gegroeid. *Vanda tricolor* is eigenlijk niet geschikt voor kamercultuur.

Augustus 1975